

Wat is een besnijdenis?

Een besnijdenis is een ingreep waarbij de voorhuid of het grootste deel van de voorhuid van de penis wordt verwijderd.

Een besnijdenis of fimosectomie wordt uitgevoerd wanneer de voorhuid vernauwd geraakt. Hierdoor kan pijn ontstaan bij het naar achter schuiven van de voorhuid of bij het zwellen van de penis.

De ingreep kan ook plaatsvinden op vraag van de patiënt, zonder dat de voorhuid afwijkend is.

Vorbereiding op de ingreep

Je zoon moet nuchter zijn bij zijn opname in het ziekenhuis. Bij aankomst in het ziekenhuis meld je je aan bij de opnamedienst. Een medewerker zal hem inschrijven. Als ouder onderteken je hier ook toestemmingsformulier dat ook al ondertekend werd door de chirurg.


Je zontje krijgt een patiëntenidentificatiebandje aan zijn pols en jullie gaan daarna samen naar de kinderafdeling. Een verpleegkundige zal jullie daar verwelkomen en jullie een kamer toewijzen.

Begeleiding bij de operatie

Eén ouder kan het kind vergezellen naar de operatiezaal en bij hem blijven tot de algemene verdoving is toegediend. Nadien wordt ook nog een lokale verdoving toegediend om ervoor te zorgen dat het kind bij het ontwaken geen pijn ervaart.

Operatietechniek

De chirurg maakt een insnede rond de penis voor het begin van het vernauwde stuk. Een tweede insnede bevindt zich onder de glanspenis of eikel. Het nauwe segment wordt verwijderd. Nadien wordt de huid weer gehecht. Dit gebeurt met verteerbare draadjes.



De ingreep kan ook voorhuidsparend worden uitgevoerd zodat nadien de glanspenis of eikel nog bedekt blijft. Dit is enkel mogelijk wanneer er voldoende gezonde voorhuid aanwezig is.

Om al te veel zwelling of nabloeding te vermijden wordt een aansluitend plakverband aangebracht. Afhankelijk van de situatie kan dit ook een wikkerverband zijn.

Na de operatie

Bij het ontwaken kan je als ouder je kind opnieuw bijstaan. Soms is dit niet mogelijk door specifieke omstandigheden in de ontwaakkamer.

Vrij vlug na de ingreep kan het kind terugkeren naar de kinderafdeling. Enkele uren later komt de uroloog langs en zal je zontje de afdeling kunnen verlaten.

Nazorg

Bij pijn kan het kind, volgens gewicht, tot vier keer per dag paracetamol innemen. Indien dit niet volstaat om de pijn te verzachten, kan een onstekingsremmer (bv. Ibuprofen), eveneens volgens gewicht en tot drie keer per dag, extra helpen. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je een geneesmiddelenvoorschrift mee.

24 uur na de ingreep mag het verbandje rond de penis verwijderd worden. Vervolgens breng je twee maal per dag Terra-Cortril zalf aan. Je krijgt deze zalf mee bij ontslag uit het ziekenhuis.

De aanwezige draadjes verdwijnen normaal spontaan na 10 tot 20 dagen.

Douchen is toegestaan. Met baden wacht je beter nog 7 tot 10 dagen.

Verwikkelingen

Nabloeding

Heel soms kunnen de spontane nachtelijke erecties verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een nabloeding. Als dat het geval is, is een vroegtijdige controle bij de uroloog noodzakelijk.

Ontsteking

Het toenemen van pijn of lokale roodheid kan een gevolg zijn van een ontsteking. Ook in dit geval is het belangrijk contact op te nemen met de uroloog.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met je behandelende arts.

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Nuttige telefoonnummers:
Kinderafdeling: 09 387 72 40



Besnijdenis bij het kind