

Wat is een coloscopie?

Een coloscopie is een kijkonderzoek van de dikke darm. Met een endoscoop, een soepel buisvormig toestel met een kleine camera op, wordt de dikke darm en eventueel het laatste stuk van de dunne darm onderzocht.



De endoscoop laat ook toe om tijdens het onderzoek instrumenten te hanteren om kleine stukjes weefsel weg te nemen voor microscopisch onderzoek, bloedingen te stelpen of poliepen (kleine gezwellen) te verwijderen.

Een coloscopie vindt plaats in het dagziekenhuis. Je kan dus dezelfde dag alweer terug naar huis.

Vorbereiding

- Drie dagen voor het onderzoek vermijd je om druiven, tomaten, kiwi's en zaadjes te eten. De dag vóór het onderzoek eet je restenarme voeding (zie folder Moviprep).

- De dag vóór het onderzoek (rond 17 uur-18 uur, drink je de eerste portie Eziclen. Daarna moet je nog 1 liter water drinken. Ongeveer 1 uur na de inname begint de darmlediging. Na het starten van de voorbereiding mag je niets meer eten.
- De dag van het onderzoek drink je 's morgens de tweede portie Eziclen en daarna opnieuw nog 1 liter water. Je zorgt ervoor dat je ten minste 2 uur gestopt bent met drinken vóór het uur waarop je je aanmeldt in het ziekenhuis.

Aandachtspunten

Als je bloedverdunnende medicatie inneemt, meld je dit steeds vooraf aan je behandelde arts.

Doorgaans moet de inname van deze geneesmiddelen een week of 48 uur voor het onderzoek stoppen. Soms moeten er inspuitingen gegeven worden ter vervanging van je medicatie in pilvorm. Bij wegname van een poliep zal de arts je vertellen wanneer je de bloedverduunners opnieuw mag starten.

Het is niet toegestaan om na het onderzoek de wagen zelf te besturen. Je zorgt dus voor een begeleider of chauffeur die je naar huis brengt.

Mogelijke verwikkelingen

Een coloscopie heeft een beperkte kans op verwikkelingen. De voornaamste zijn een perforatie van de darm (gaatje in de darm) en darmbloedingen.

Anesthesie

Doorgaans wordt een coloscopie onder algemene verdoving uitgevoerd. Soms kan een coloscopie ook zonder verdoving uitgevoerd worden. In dat geval wordt een kalmerend middel toegediend.

Hoe verloopt mijn opname?

Je meldt je aan op het afgesproken tijdstip aan de opnamebalie van het dagziekenhuis (via spoedopname, Meulenstraat). Je schrijft je in en begeeft je vervolgens naar het internistisch dagziekenhuis op de derde verdieping.

De verpleegkundige zal met jou nog een vragenlijst overlopen en zal je bloeddruk, pols en temperatuur meten. De verpleegkundige zal ook een infuus plaatsen. Het infuus is nodig om de verdoving te kunnen toedienen.

Daarna brengt de verpleegkundige je naar de endoscopiezaal. Gemiddeld duurt een coloscopie 30 minuten. Als er poliepen moeten verwijderd worden, kan dit iets langer duren.

Na het onderzoek word je terug naar je kamer gebracht waar je nog even op je linkerzijde in bed moet rusten. Als je goed wakker bent, mag je opstaan en krijg je een broodmaaltijd. Als je geen klachten hebt, wordt je infuus na de maaltijd verwijderd.

Hoe gebeurt het ontslag?

Je behandelde arts komt nog bij je langs op de kamer voor je naar huis mag om het resultaat van het onderzoek met jou te bespreken. Indien nodig kan je een afwezigheidsattest voor je werkgever voor de dag van het onderzoek vragen aan de arts.

Waar moet ik thuis nog rekening mee houden?

- Na het onderzoek kan je buikkrampen, een opgezette buik en winderigheid ervaren.
- Bij felle of laattijdige pijn is het aangewezen contact op te nemen met het dagziekenhuis.
- Als gevolg van een biopsie (wegname van weefsel) of een verwijdering van een poliep is soms wat bloedverlies mogelijk. Bij veel bloedverlies neem je contact op met het dagziekenhuis.
- De dag na het onderzoek kan je je normale activiteiten hervatten.


Tot slot

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelend arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Nuttige telefoonnummers:

Secretariaat digestief centrum: 09 387 70 58

Internistisch dagziekenhuis: 09 387 74 53



Coloscopie

