


## Wat?

Cryptorchidie is een niet ingedaalde teelbal bij het kind. De teelbal ontwikkelt zich normaal in de omgeving van de nier en gaat vervolgens indalen tot in de balzak. Tijdens de indaling kan de teelbal verhinderd geraken door vergroeiingen, te korte bloedvaten of door een liesbreuk. De teelbal bevindt zich dan veelal in het lieskanaal. Het is een frequent voorkomende, aangeboren aandoening (1 % van alle jongentjes).



Een chirurg (uroloog) plaatst tijdens een ingreep, via de lies, de teelbal in de balzak.

## De dag van de ingreep

Je kind moet nuchter zijn bij zijn opname. Je meldt je samen met je zoon aan op het afgesproken tijdstip bij de opnamedienst. Je ondertekent het door de chirurg reeds ondertekende toestemmingsformulier voor heelkunde bij minderjarigen. Je zoon krijgt een patiëntidentificatiebandje om.

Een medewerker begeleidt jullie naar de kinderafdeling, waar jullie opgevangen worden door een verpleegkundige. Je krijgt een kamer toegewezen.

Eén ouder kan het kind vergezellen naar de operatiezaal. Je mag bij je kind blijven tot de algemene verdoving is toegediend. Nadien volgt ook een lokale verdoving gegeven (caudaal blok) om ervoor te zorgen dat het kind ook tijdens het ontwaken geen pijn voelt.

## De operatie

Er wordt een insnede gemaakt in de lies van 2 cm. De teelbal wordt daarna vrij gelegd en de chirurg behandelt een eventueel aanwezige liesbreuk. Nadien wordt de snede gesloten met inwendig verteerbare draad.

Daarna wordt een kleine insnede gemaakt in de balzak, waar een nieuwe holte wordt ontwikkeld om de teelbal in vast te leggen. De huid van de balzak wordt gehecht met twee oppervlakkige, verteerbare draadjes.

## Na de operatie

Doorgaans mag een ouder bij zijn kind zijn in de ontwaakzaal. Enkel in uitzonderlijke / specifieke gevallen is dit niet mogelijk.

Vrij snel na de ingreep mag het kind terugkeren naar de kinderafdeling. Enkele uren later komt de uroloog langs en daarna mogen jullie het ziekenhuis verlaten.

## Nazorg

Kinderen ervaren doorgaans niet zo veel pijn na deze ingreep. Paracetamol of ibuprofen kan eventuele pijn verzachten.

Een (beperkte) zwelling ter hoogte van de lies en de balzak is mogelijk, net als een lichte blauwverkleuring van de huid.

Douchen is toegestaan na de ingreep. Een bad nemen kan opnieuw na één week.

Vanaf 3 weken na de ingreep is sporten en zwemmen opnieuw toegestaan.

## Controleafspraak

Eén week na de ingreep, maak je een afspraak bij de huisarts om de inwendige hechtingsdraadjes in de lies te verwijderen. De hechtingen in de balzak zullen spontaan verdwijnen.

Een controleraadpleging bij de uroloog is voorzien na drie tot vier weken.

## Risico's en verwickelingen

Een nabloeding of een lokale ontsteking kan optreden maar is heel zeldzaam. In dat geval is een vroegtijdige controle zeker aangewezen.

## Afwezigheid op school

Neem contact op met een verpleegkundige of kinderarts indien briefjes voor afwezigheid op school, turnen, zwemmen, crèche nodig zijn. Ook als je als ouder sociaal verlof nodig hebt, neem je contact op.

## Tot slot

Deze folder is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de behandelende arts. Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Nuttige telefoonnummers:

Kinderafdeling: 09 387 72 40



## Cryptorchidie bij het kind