Beste patiënt

Elk ziekenhuis heeft te maken met micro-organismen (ook bacteriën of microben genoemd) die schade kunnen veroorzaken. Deze micro-organismen kunnen reeds aanwezig zijn bij opname in het ziekenhuis, maar ook overgedragen worden van de ene patiënt naar de andere.

Ieder ziekenhuis treft daarom bepaalde maatregelen om verspreiding van microorganismen tegen te gaan.

Uw arts of verpleegkundige heeft u ingelicht over het feit dat bij u een micro-organisme is gevonden nl. Clostridium difficile. Daarom is het noodzakelijk een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen om verdere verspreiding binnen het ziekenhuis te voorkomen.

Wat is clostridium difficile?

Clostridium difficile komt bij 3% van de volwassenen voor. In ziekenhuizen is Clostridium difficile de belangrijkste oorzaak van diarree. De voornaamste uitlokkende factor voor het ontwikkelen van diarree is antibiotica (=bacteriedodend medicijn). Vooral oudere patiënten zijn vatbaar voor Clostridium difficile.Gezonde personen kunnen drager zijn van Clostridium difficile zonder er iets van te merken.

Gevolgen

Diarree door Clostridium difficile is doorgaans waterig. De stoelgang heeft een karakteristieke, doordringende geur. Er kan wat slijm in de stoelgang aanwezig zijn. De diarree kan gepaard gaan met buikpijn en koorts.Ernstige infecties kunnen complicaties veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Clostridium difficile wordt vooral overgedragen via de handen en via contact met de besmette omgeving.
Om de overdracht van het micro-organisme naar andere patiënten te voorkomen, ligt u op een éénpersoonskamer.
De ziekenhuiswerkers (artsen, verpleegkundigen, kinesisten ...) zullen bij uw behandeling of verzorging handschoenen en een beschermschort dragen.

Bezoek

Uw bezoek mag geen gebruik maken van het toilet op uw kamer. Ook moeten ze hun handen wassen en ontsmetten vóór het verlaten van de kamer.Zij bezoeken geen andere patiënten of ruimtes op de afdeling. Na hun bezoek verlaten ze het ziekenhuis onmiddellijk.

Onderzoek of behandeling

Clostridium difficile is geen reden om uw onderzoek of behandeling uit te stellen.

Doe vóór het vervoer een propere pyjama aan. Was eerst en ontsmet nadien ook uw handen. Uw kledij wordt in een plastic zak meegegeven aan uw familie. Dit linnen moet afzonderlijk gewassen worden op 60° en steeds een volledige wascyclus, geen kort programma.
Tijdens de acute fase met diarree is het aan te raden steeds het toilet door te spoelen met gesloten deksel.

Wanneer isolatie opheffen?

Wanneer u al 2 tot 3 dagen vaste stoelgang heeft, mag de isolatie stoppen.
Indien u opnieuw diarree krijgt, worden de voorzorgsmaatregelen opnieuw ingevoerd, zonder op het resultaat van de stoelgangkweek te wachten.

Handhygiëne boven alles

Indien u nog bijkomende vragen heeft, richt u dan tot het Comité voor ziekenhuishygiëne, verpleegkundige of behandelende arts. Zij zullen u graag te woord staan.

216 - 3.0



PATIËNTENINFO

Clostridium difficile

MARIA MIDDELARES
GezondheidsZorg met een Ziel

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59
info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be

Volg ons ook op:

ZIEKENHUISHYGIENE