


Wat?

Cryptorchidie is een niet ingedaalde teelbal bij het kind. De teelbal ontstaat normaal in de omgeving van de nier en gaat vervolgens indalen tot in de balzak. Hierbij kan deze vastgehouden worden door een te korte bevoeiing of door een aanwezige liesbreuk. De teelbal bevindt zich dan veelal in het lieskanaal. Het is een veelvoorkomende aangeboren probleem en is aanwezig bij 1 % van alle jongetjes



Vorbereiding

Je zoon moet nuchter zijn bij opname. Je meldt je samen met je zoon aan bij de opnamedienst, waar hij wordt ingeschreven. Je ondertekent het door de chirurg ondertekende toestemmingsformulier. Je zoon krijgt een patiëntidentificatiebandje aan en jullie gaan daarna samen naar de dienst pediatrie, waar jullie verwelkomd worden door een verpleegkundige. Je zal daar een kamer toegewezen krijgen voor het verblijf.

Eén van de ouders kan hem dan vergezellen naar de operatiezaal en bij hem blijven tot de algemene verdoving is toegediend. Nadien wordt ook een lokale verdoving gegeven - caudaal blok - om ervoor te zorgen dat er bij het ontwaken geen pijn wordt gevoeld.

De operatie

Er wordt een insnede gemaakt in de lies van 2 cm met het openen van het lieskanaal. De teelbal wordt vrij gelegd en een eventueel aanwezige liesbreuk wordt behandeld.

Vervolgens wordt er een kleine insnede gemaakt in de balzak waar een nieuwe holte wordt ontwikkeld om de teelbal in vast te leggen. De liesinsnede wordt gesloten met een inwendige verteerbare draad. De huid van de balzak wordt gesloten met twee oppervlakkige verteerbare draadjes.

Na de operatie

Bij het ontwaken kan je normaal opnieuw aanwezig zijn bij je kind. Soms is dit niet mogelijk door specifieke omstandigheden in de ontwaakkamer.

Vrij vlug na de ingreep kan hij terugkeren naar de kinderafdeling.

Enkele uren later komt de uroloog langs en zal je zoon de afdeling kunnen verlaten.

Nazorg

Pijn door de ingreep is veelal weinig uitgesproken.

Dit kan worden behandeld met een dosis paracetamol of Ibuprofen naargelang het gewicht van het kind. Er kan een beperkte zwelling optreden van het lieskanaal en van de balzak. Een lichte blauwverkleuring van de huid is ook mogelijk.

Hij mag douchen maar voor een bad moet je een week wachten.

Na een week moet hij zich melden bij de huisarts voor het afknippen of het verwijderen van de inwendige huiddraad. De hechtingen in de balzak zullen spontaan verdwijnen.

Gedurende veertien dagen na de ingreep mag hij niet zwemmen of deelnemen aan sportactiviteiten.

Een controleraadpleging bij de uroloog is voorzien na drie à vier weken.

De risico's en complicaties

Een nabloeding of een lokale ontsteking kan optreden maar is heel zeldzaam. Een vroegtijdige controle is dan zeker aangewezen.

Tot slot

Indien je briefjes voor afwezigheid school, turnen, zwemmen, crèche of sociaal verlof nodig hebt, gelieve dit tijdig door te geven aan de verpleegkundige op de dienst of de behandelende arts.

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met

je behandelende arts. Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Nuttige telefoonnummers:

Kinderafdeling: 09/387 72 40



Cryptorchidie bij het kind

