

Wat is Infliximab®?

Infliximab® is een eiwit dat deels afkomstig is van menselijke en deels van muizen eiwitten. Infliximab® blokkeert de werking van het ontstekings eiwit 'Tumornecrosefactor alfa'. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van verschillende ontstekingsprocessen in het lichaam en het blokkeren ervan kan de ontsteking in het lichaam onderdrukken. Infliximab wordt toegediend onder de naam Remicade® of Remsima®.

Bij welke aandoeningen wordt Infliximab® toegediend?

De meest voorkomende indicaties zijn ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van de slijmvliezen van het maag-darmkanaal. Meestal zijn de dunne en/of dikke darm getroffen, maar ook de mond of anus kunnen aangetast zijn. Bij Colitis Ulcerosa beperkt de chronische ontsteking zich tot het slijmvlies van de dikke darm. Infliximab® kan de darmontsteking onderdrukken waardoor klachten zoals buikpijn en diarree afnemen. Het kan de ziekte evenwel niet definitief genezen.

Andere aandoeningen waarbij Infliximab® kan toegediend worden zijn:

- Reumatoïde artritis
- Spondylitis ankylosans
- Artritis psoriatica
- Psoriasis

Hoe krijg je Infliximab® toegediend?

Infliximab® is een geneesmiddel dat via een infuus

toegediend wordt. Infliximab® wordt toegediend op het dagziekenhuis. De eerste keer verloopt het infuus met Infliximab® traag. Je wordt zeer regelmatig geobserveerd door een verpleegkundige om eventuele bijwerkingen of reacties snel op te merken. Als er geen problemen zijn tijdens of na een eerste toediening, kan het infuus de volgende keren over twee uur inlopen.

Hoe ziet het behandelingsschema eruit?

Bij het opstarten van de behandeling met Infliximab® bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa krijg je een toediening op week nul, week twee, week zes en week veertien.

Als onderhoudsbehandeling wordt Infliximab om de 8 weken toegediend.

Welke zijn de mogelijke bijwerkingen?

- Tijdens het infuus kunnen soms allergische reacties optreden zoals huiduitslag, jeuk, rillingen, kortademigheid en lage bloeddruk. Dit kan meestal worden opgevangen door het infuus trager te laten lopen. Soms is het evenwel nodig om medicijnen toe te dienen die de allergische reactie onderdrukken.
- Andere mogelijke bijwerkingen zijn milde infecties zoals een verkoudheid, griepachtige symptomen, hoofdpijn, misselijkheid en diarree.
- In zeldzame gevallen kan een ernstige infectie optreden. Symptomen hiervan zijn hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten. In dit geval moet je zeker een arts raadplegen.

Wanneer mag Infliximab® niet worden toegediend?

- Aanwezigheid van tuberculose: daarom moeten patiënten altijd getest worden op tuberculose voor de behandeling gestart wordt.
- Zwangerschap en borstvoeding worden afgeraden
- Aanwezigheid van een ernstige infectie
- Bij hartdecompensatie

Hoe verloopt je opname?

Op de afgesproken datum en tijdstip meld je je aan bij de opnamedienst van het ziekenhuis. Je wordt ingeschreven en de weg naar het internistisch dagziekenhuis wordt je uitgelegd.

Je meldt je aan op het internistisch dagziekenhuis (derde verdieping). De verantwoordelijke verpleegkundige zal je begeleiden naar je plaats.

Op verschillende momenten tijdens je verblijf zal gevraagd worden naar je voornaam, achternaam en geboortedatum en zal je je polsbandje moeten tonen. Dit is een extra voorzorgsmaatregel om vergissingen te voorkomen, bv. bij het toedienen van medicatie, ...

Wanneer je aan de beurt bent, zal de verpleegkundige bloed prikken (via een ader of via een poortkatheter) en je parameters controleren (gewicht, bloeddruk, polsslag en temperatuur). Nadien zal een waakinfluus gestart worden in afwachting van Infliximab®. Wanneer er geen klachten zijn en/of de bloeuitslagen in orde zijn, schrijft de arts de Infliximab® voor. Met dit

voorschrift gaat men in de apotheek de medicatie klaarmaken.

Na de toediening van het infuus worden je bloeddruk en pols nogmaals gecontroleerd. Als er geen klachten zijn na het inlopen van het infuus, mag je naar huis. Je krijgt een afspraak mee voor de volgende toediening.

Binnen de 72 uur na je toediening zal een medewerker van het dagziekenhuis je telefonisch contacteren om na te gaan of je geen problemen/mogelijke reacties hebt gehad.

Tot slot

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Nuttige telefoonnummers:

Secretariaat gastro-enterologie: 09/387 70 58

Dagziekenhuis interne: 09/387 74 57



Infliximab®

