

## Wat?

Bij je zoon werd een zwelling vastgesteld van de lies of de balzak. Dit is te wijten aan een blijvend open kanaal tussen de buik en de balzak. Normaal gezien sluit dit kanaaltje zich voor de geboorte, maar af en toe blijft dit openstaan.

Tijdens de groei van het kind wordt dit kanaaltje breder waardoor er vocht naar het balzakje kan stromen. Dit geeft aanleiding tot een "waterbreukje" in de volksmond of "hydrocoele communicans". Hierdoor zien we soms een zwelling ter hoogte van de lies die vooral opvalt als het kind veel heeft gespeeld.



Zeldzaam kan een klembreuk ontstaan. Dit is uiteraard een urgentie.

## Vorbereiding

Je zoon moet nuchter zijn bij opname. Je meldt je samen met hem aan bij de opnamedienst, waar hij wordt ingeschreven.

Je ondertekent het door de chirurg ondertekende toestemmingsformulier. Je zoon krijgt een patiëntidentificatiebandje aan en jullie gaan daarna samen naar de dienst pediatrie, waar jullie

verwelkomd worden door een verpleegkundige. Je zal daar een kamer toegewezen krijgen voor het verblijf.

Eén van de ouders kan hem dan vergezellen naar de operatiezaal en bij hem blijven tot de algemene verdoving is toegediend. Nadien wordt ook een lokale verdoving gegeven – caudaal blok – om ervoor te zorgen dat er bij het ontwaken geen pijn wordt gevoeld.

## De operatie

Er wordt een insnede gemaakt in de lies van 2 cm met het openen van het lieskanaal. De open doorgang wordt vrijgelegd - van de zaadleider en de bloedvaten - en afgebonden aan het buikvlies.

De huid wordt gesloten met een inwendige verteerbare draad.

## Na de operatie

Bij het ontwaken kan je normaal opnieuw aanwezig zijn bij je kind. Soms is dit niet mogelijk door specifieke omstandigheden in de ontwaakkamer.

Vrij vlug na de ingreep kan hij terugkeren naar de kinderafdeling.

Enkele uren later komt de uroloog langs en zal je zoon de afdeling kunnen verlaten.

## Nazorg

Pijn door de ingreep is veelal weinig uitgesproken.

Dit kan worden behandeld met paracetamol volgens gewicht van het kind tot maximum vier keer per dag of Nurofen volgens gewicht van het kind tot maximum drie keer per dag. Er kan een beperkte zwelling optreden van het lieskanaal en van de balzak. Een lichte blauwverkleuring van de huid is ook mogelijk.

Hij mag douchen maar voor een badje moet je wachten tot de huidhechting verwijderd is.

Na een week moet hij zich melden bij de huisarts voor het afknippen of het verwijderen van de inwendige huiddraad.

Gedurende veertien dagen na de ingreep mag hij niet zwemmen of deelnemen aan sportactiviteiten.

Een controle raadpleging bij de uroloog is voorzien na drie à vier weken.

## Verwikkelingen

- Bloeding
- Infectie
- Bij toegenomen pijn of zwelling dien je vroegtijdig contact te nemen met je huisarts of uroloog.

## Tot slot

Indien je briefjes voor afwezigheid school, turnen, zwemmen, crèche of sociaal verlof nodig hebt, gelieve dit tijdig door te geven aan de

verpleegkundige op de dienst of de behandelende arts.

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met je behandelende arts. Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Nuttige telefoonnummers:

Kinderafdeling: 09/387 72 40



## Liesbreuk bij het kind

